

医療をずっとあなたのそばに

# わかば便り

第57号（令和7年1月）



皆さま、あめましておめでとうございます。本年も地域の皆さまのお役に立てるよう職員一同、努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

今月号では、「AGA（男性型脱毛症）」の治療についてご紹介したいと思います！

## AGAは、早めのケアが大切です。

AGAとは男性型脱毛症の略で男性に多くみられる脱毛症のことです。思春期以降に額や頭の側面から少しずつ髪がうすくなり、髪の質も細く短くなっていきます。AGAは遺伝が関係するといわれ、ほおっておくと進行していきますので進行を抑えるためには早めのケアが大切です。5年後に後悔しないよう、気になる方はお早めにご相談ください。



## 治療の流れ

まずはご相談ください。医師によるカウンセリングを行い、診断・治療方法を話し合っ決めていきます。治療には、飲む方法と、塗る方法があります。効果など詳しくは当院の担当医師までご相談ください。治療を開始したら定期的な検診が必要となります。AGA治療は、一般的には効果がでるまで少なくとも3ヵ月程度かかります。治療の経過や状態を定期的に確認しながら、継続的な治療をおこないます。

## 使用するお薬

### プロペシア 1mg 28錠

#### ●用法・用量

通常、成人は1回主成分として0.2mgを1日1回服用する。必要に応じて適宜増量されますが、1日1mgを上限とする。

#### ●想定される副作用

肝機能障害、勃起不全、リビドー（性欲）減退、精液量減少、射精障害、睾丸痛、発疹など

### フィナステリド 1mg 28錠

#### ●用法・用量

通常、成人はフィナステリドとして0.2mgを1日1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、1日1mgを上限とする。

#### ●想定される副作用

性欲減退や勃起機能障害（ED）などの男性機能低下、肝機能障害など

### ザガーロカプセル 0.5mg 30P

#### ●用法・用量

通常、成人は1回1カプセル（主成分として0.5mg）を1日1回服用します。必要に応じて1カプセル中主成分として0.1mgを含むカプセルを1日1回1カプセルに切り替えられることがあります。

#### ●想定される副作用

肝機能障害、勃起不全、リビドー（性欲）減退、精液量減少、射精障害、睾丸痛、発疹など

### フィナステリド 0.2mg 28錠

#### ●用法・用量

通常、成人はフィナステリドとして0.2mgを1日1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、1日1mgを上限とする。

#### ●想定される副作用

性欲減退や勃起機能障害（ED）などの男性機能低下、肝機能障害など

医療法人わかば会

わかばクリニック

〒862-0903 熊本市東区若葉2丁目13-16 1階

お問い合わせ

平日：8:30～12:00 / 15:00～18:30  
土曜：8:30～12:00 / 15:00～17:00

TEL 096-285-6014

Webサイト

